




## Guide d'évaluation des Précautions Covid en établissement

Ce guide d'évaluation se veut une aide à la recherche des « petits écarts » (mais aussi des écarts majeurs) dans le respect des bonnes pratiques de port de masque, d'hygiène des mains, et de distanciation physique. Le guide propose de vérifier, d'une part en posant des questions (par téléphone lors d'un premier contact, ou sur place en rencontrant les soignants), et en observant l'équipe, les points d'écarts les plus fréquemment retrouvés.




Pour l'observation les items sont volontairement repris pour chaque type de lieu. Pour chaque item, on propose de cocher la case correspondant au « feu vert » si les bonnes pratiques semblent toujours bien respectées, le « feu orange » si on constate quelques écarts, et le « feu rouge » si on repère des écarts fréquents ou majeurs.




Il est également possible en complément de remettre ce guide à l'équipe soignante pour qu'elle s'autoévalue.

### A demander à l'équipe soignante




			
Si certains agents font du <b>covoiturage</b> , ils portent le masque dans la voiture pendant tout le trajet			
S'il y a des <b>intérimaires</b> , ils sont formés aux précautions standard en contexte Covid et arrivent dans le service avec un masque			
S'il y a des <b>bénévoles</b> , ils sont formés aux précautions standard en contexte Covid et arrivent dans le service avec un masque			
Les <b>internes et les médecins portent un masque dans leur bureau collectif</b>			
Ils sont <b>formés aux précautions standard en contexte Covid</b>			
<b>L'équipe médicale porte un masque pendant les pauses (café ou autre)?</b>			
Lors de ses pauses/repas, <b>l'équipe médicale respecte la distanciation physique</b>			
Les agents portent un masque dans le <b>vestiaire</b>			
Les agents portent un masque lors des <b>transmissions</b>			
Si <b>retrait temporaire de masque</b> , le masque est posé correctement sur un essuie-tout ou une surface propre désinfectée ensuite			
Y a-t-il dans l'équipe des <b>agents opposants ou simplement réticents au port de masque ?</b>			
Les soignants connaissent-ils des agents dans le service qui portent mal (sous le nez, sous le menton), ou qui ne portent pas toujours leur masque pendant les soins, ou avec leurs collègues ?			
L'équipe sait que les <b>gestes à risques d'aérosolisation</b> se font avec un masque FFP2 <b>pour tous les patients</b> , Covid ou non Covid			
<b>Plusieurs tailles ou modèles de FFP2 disponibles</b> pour que chaque agent dispose d'un masque adapté à son visage			
Les équipes peuvent <b>s'approvisionner sans problème</b> en masques (chirurgicaux et FFP2), SHA, lunettes de protection, protection de la tenue, produits d'entretien, <b>y compris la nuit et le WE</b>			
Les agents savent qu'un <b>masque FFP2 retiré ne doit pas être remis</b>			
Les agents utilisent <b>des protections oculaires</b> et connaissent leurs <b>modalités d'entretien</b>			
Les agents ont des <b>flacons de poche de SHA, ou accès aisément</b>			
L'endroit où se déroule les <b>pauses cigarettes</b> permet de <b>respecter la distanciation</b> , y compris <b>quand il pleut ?</b>			
Y a-t-il des <b>patients (déments ou non) qui circulent sans masque</b> dans les parties communes?			
L'équipe s'assure que <b>les patients font une HDM avant de sortir de leur chambre ?</b>			
Y a-t-il eu des <b>événements « festifs »</b> (« galette », anniversaire, départ,...) entre soignants dans les jours qui ont précédé le cluster, le jour ou la nuit, dans les locaux de l'établissement ou en dehors ?			
Pour la prise en charge des patients Covid, les <b>surblouses (ou le tablier) sont à UU ou réservées à 1 patient et 1 professionnel?</b>			
Une procédure est-elle prévue pour <b>l'aération des locaux</b>			




### A observer dans le service




De façon générale			
les <b>prérequis à l'HDM</b> sont bien respectés			
Les <b>techniques de frictions</b> observés sont correctes			
Les agents qui <b>fument en extérieur respectent la distanciation</b>			




Dans la salle de soins			
Les agents <b>portent tous un masque</b>			
Les agents ne « <b>tripotent</b> » <b>pas leur masque</b>			
Les agents font une <b>hygiène des mains avant/après manipulation de masque</b>			
Les agents ont un <b>flacon de SHA à portée?</b>			
Les agents <b>gardent bien leur masque pour téléphoner</b>			
Voit-on des <b>masques sous le nez ou le menton ?</b>			
Voit-on des <b>masques mal adaptés au visage</b> (trop grand, baillant sur les côtés ou sous le menton) ?			

*Manipulation = usage normal du masque : le mettre, l'enlever, le réajuster quand il glisse ; « Tripotage » = manipulations « compulsives » du masque, sans objectif particulier*

Dans les bureaux, surtout collectifs (médecins, internes,...)				
Les agents <b>portent tous un masque</b>				
Les agents ne « <b>tripotent</b> » pas leur masque				
Les agents font une <b>hygiène des mains avant/après manipulation de masque</b>				
Les agents ont un <b>flacon de SHA à portée?</b>				
Les agents <b>gardent bien leur masque pour téléphoner</b>				
Voit-on des <b>masques sous le nez ou le menton</b> ?				
Voit-on des <b>masques mal adaptés au visage</b> (trop grand, baillant sur les côtés,...) ?				

Dans le couloir				
Les agents <b>portent tous un masque</b>				
Les agents ne « <b>tripotent</b> » pas leur masque				
Les agents font une <b>hygiène des mains avant/après manipulation de masque</b>				
Les agents <b>gardent bien leur masque pour téléphoner</b>				
Voit-on des <b>masques sous le nez ou le menton</b> ?				
Voit-on des <b>masques mal adaptés au visage</b> (trop grand, baillant sur les côtés,...) ?				
Les éventuels <b>patients dans le couloir portent un masque</b> Ce masque est <b>bien positionné</b> ?				
Il y a des <b>flacons de SHA à disposition</b> (sur distributeur, chariot,...?)				
Il y a un <b>flacon de SHA à côté des boîtes de masques</b>				

Dans les salles de pause ou de réunion				
Les agents <b>portent tous un masque</b>				
Les agents ne « <b>tripotent</b> » pas leur masque				
Les agents font une <b>hygiène des mains avant/après manipulation de masque</b>				
Les agents <b>gardent bien leur masque pour téléphoner</b>				
Voit-on des <b>masques sous le nez ou le menton</b> ?				
Voit-on des <b>masques mal adaptés au visage</b> (trop grand, baillant sur les côtés,...) ?				
La <b>distanciation est respectée</b>				
Le <b>nombre max de personne en salle de pause est indiqué de façon visible</b>				
La <b>table dans la salle de pause est de taille compatible</b> avec le nombre de personnes prévu pour la salle				
Il y a un <b>flacon de SHA dans la salle de pause</b>				
Les agents font une <b>HDM en entrant dans la salle</b>				
Les agents portent le <b>masque quand ils ne sont pas en train de manger/boire</b>				
Les <b>surfaces sont nettoyées/désinfectées</b> après utilisation				

Lors des soins				
Il n'y a pas de <b>port de gants inapproprié</b> ? (demander aux agents entrant dans une chambre avec des gants la raison de leur port de gants)				
Voit-on des <b>masques sous le nez ou le menton</b> ?				
Voit-on des <b>masques mal adaptés au visage</b> (trop grand, baillant sur les côtés ou sous le menton) ?				
Les agents ont un gros <b>flacon de SHA à portée</b> , ou un flacon de poche				
Il y a un <b>flacon de SHA à côté des boîtes de masques</b>				
La technique du <b>fit-check FFP2 canard</b> est respectée ?				
La technique du <b>fit-check FFP2 à coque rigide (3M)</b> est respectée ?				
Les agents portent-ils des <b>protections oculaires</b>				
- Systématiquement pour la prise en charge d'un patient Covid ?				
- Pour les soins à risque de projections pour les autres patients ?				

Manipulation = usage normal du masque : le mettre, l'enlever, le réajuster quand il glisse ; « Tripotage » = manipulations « compulsives » du masque, sans objectif particulier