

## Conduite à tenir en cas de traitement de la gale par l'Ascabiol®

◆ **J + 0 : Jour du traitement médical veiller à avoir une bonne hygiène des ongles** (courts et brossés) **et prendre un bain ou une douche chaude** suivie d'un séchage doux et sommaire (l'Ascabiol ® peut être irritant notamment sur une peau altérée et chez les sujets âgés).

Le jour du traitement, il est important d'utiliser du linge propre (vêtement ; serviette de bain) et de changer de linge de lit afin d'éviter la poursuite d'une contamination éventuelle.

**Appliquer l'Ascabiol® avec un pinceau large** (7cm) type queue de morue (ne pas utiliser de coton ou de lingette) en deux applications successives (une seule application pour les enfants de moins de deux ans et les femmes enceintes) à 10/15 minutes d'intervalle (temps de séchage) sur la totalité de la surface corporelle en insistant sur les lésions, sans oublier les plis cutanés, sous les seins, le nombril, les parties génitales, sous les ongles et en évitant le visage ;

**Puis un temps de contact de 24 heures doit être respecté.** Il est réduit à 12 heures dans les cas particuliers de l'enfant de moins de deux ans (voir six heures pour les plus jeunes) et de la femme enceinte.

Il est conseillé de réaliser l'application du médicament le soir après le repas afin d'éviter toute toilette ultérieure pendant le temps de contact, en particulier celle des mains. Dans le cas où un lavage des mains aurait été nécessaire, il faut réaliser une nouvelle application.

◆ **J + 1 : Traitement de l'environnement le lendemain matin, procéder au nettoyage classique des locaux** (et en cas de gale profuse ou hyperkératosique à une désinfection par un acaricide des matelas, sommiers et autres mobiliers absorbants) ;

**Rassembler le linge utilisé jusqu'à ce jour** (y compris serviettes de toilette, draps, taies...) et le laver en machine à 60°C ou le désinfecter avec un acaricide type A-PAR (stockage en sac plastique avec produit acaricide pendant au moins trois heures) dans un sac plastique ;

**Par la suite et 24 heures après la dernière application d'Ascabiol®, prendre une douche en se savonnant avec un savon liquide.** – Le rinçage doit être abondant. Il est de nouveau nécessaire de prendre une serviette de bain propre (1<sup>er</sup> changement effectué avant le traitement).

Prendre des vêtements propres et changer les draps du lit une nouvelle fois.

◆ **J + 8 :** En fonction de l'évolution clinique et sur prescription médicale, renouveler le cas échéant une application unique.

**Après traitement, le prurit régresse le plus souvent en deux à trois jours. Cependant, les démangeaisons peuvent persister quelques semaines sans pour autant être un signe d'échec du traitement.**

## **Conduite à tenir en cas de traitement par Stromectol® (=Ivermectine) en prise au coucher**

◆ **J + 0** : Jour du traitement médical. Veiller à avoir une bonne hygiène des ongles (courts et brossés). Au coucher, prise du Stromectol® à la dose prescrite (doit être adaptée au poids de la personne) en une seule fois avec un grand verre d'eau en respectant la période de jeûne de deux heures avant et après la prise du médicament.

◆ **J + 1** : Traitement de l'environnement

- Le lendemain matin, procéder à un nettoyage classique des locaux (et en cas de gale profuse et hyperkératosique à une désinfection par un acaride des matelas, sommiers et autres mobiliers absorbants).

- Changer le linge de lit afin d'éviter la poursuite d'une contamination éventuelle et rassembler tout le linge utilisé jusqu'à ce jour et le laver en machine à 60°C ou le désinfecter avec un acaricide type A-PAR (stockage en sac plastique avec produit acaricide pendant au moins trois heures) ou par mise en quarantaine de quatre jours (gale commune) à huit jours (gale profuse) dans un sac plastique ;

- Prendre une douche au savon liquide, suivi d'un rinçage abondant, et d'un séchage avec une serviette de bain propre.

- S'habiller avec du linge propre.

Remarque : le délais d'action de l'ivermectine étant d'au moins huit heures, un traitement de l'environnement le lendemain matin, à J1, ne présente pas de risque de réinfestation, la personne étant protégée par son traitement.

**J + 15 (+/-) : 2eme prise du traitement médical uniquement si prescription médicale.** Sur prescription médicale, prise d'une deuxième cure d'ivermectine 15 jours après la première.

**Après traitement, le prurit régresse le plus souvent en deux à trois jours. Cependant, les démangeaisons peuvent persister quelques semaines sans pour autant être un signe d'échec du traitement.**

La concentration de Stromectol est maximale dans le sang au bout de 8h.

## Prise en charge du linge en cas d'épidémie de gale

**Champs d'application du linge à traiter** : Vêtements, serviette de table, draps, taies d'oreiller, housse de couette, couvertures, chaussons, gants, doudous... En cas de lésions identifiées du cuir chevelu, la liste doit être étendue aux bonnets, chapeaux, foulards, écharpes, casque de moto ou vélo.

**Gale commune** : tout le linge utilisé depuis **deux-trois jours**.

- ◆ **Se protéger avant toute manipulation du linge** : porter des gants jetables et une surblouse à manches longues ;
- ◆ Recueillir le linge dans un sac plastique en premier emballage ;
- ◆ Enlever ses gants et les jeter à la poubelle ;
- ◆ Effectuer un lavage simple des mains ;
- ◆ Si possible, mettre le sac plastique dans un deuxième emballage au seuil de la chambre ;
- ◆ Transporter le linge emballé à la blanchisserie ;
- ◆ **A la blanchisserie, se protéger** avant toute manipulation du linge (gants jetables, surblouse à manches longues) ;
- ◆ Dès que possible, **lavage en machine à 60°C** (dans ce cas, le traitement antiparasitaire du linge n'est pas nécessaire). Le linge doit être mis dans la machine à laver **en vidant la poche sans toucher le linge**, même avec des gants.
- ◆ **Sinon, isolement et traitement antiparasitaire par un acaricide type A-Par** pour les tissus ne supportant pas cette température **ou** si le lavage n'est pas envisageable (chaussures) : vaporiser l'acaricide ; fermer hermétiquement la poche (noter date et heure de la désinfection, nom et prénom du patient) ; laisser en contact au moins trois heures ; si possible, lavage à plus basse température, sinon réutilisable après deux heures d'aération ; stocker le linge dans un lieu dédié et identifié.
- ◆ Si l'utilisation d'un acaricide n'est pas envisageable, l'isolement en sac hermétique doit durer quatre jours en cas de gale commune et huit jours en cas de gale profuse. Le linge sera stocké dans une pièce dédiée et identifiée.

**Le personnel en charge du ramassage du linge doit changer de blouse en fin de manipulation du linge à risque et la mettre également à laver à 60°C.**

Précautions d'emploi : Les produits acaricides ne doivent pas être manipulés par ou en présence d'un sujet asthmatique ou d'une personne ayant des troubles respiratoires. Effectuer le traitement du linge dans une pièce aérée.

## Conduite à tenir en cas de traitement par Stromectol® (=Ivermectine) en prise matinale

### ◆ J + 0 : Jour du traitement médical.

- Au réveil, prendre son petit-déjeuner puis rester pendant deux heures, jusqu'à la prise du traitement.

- Veiller à avoir une bonne hygiène des ongles (courts et brossés).

- Prise du Stromectol® à la dose prescrite (doit être adaptée au poids de la personne) en une seule fois avec un grand verre d'eau en respectant la période de jeûne de deux heures après l'administration.

- Au coucher, prendre sa douche avec un savon liquide, se rincer abondamment et se sécher avec une serviette propre. Utiliser un pyjama et du linge de lit propres.

### ◆ J + 1 : Traitement de l'environnement

- Le lendemain matin, procéder à un nettoyage classique des locaux (et en cas de gale profuse et hyperkératosique à une désinfection par un acaricide des matelas, sommiers et autres mobiliers absorbants).

- Rassembler le linge utilisé jusqu'à ce jour (y compris serviettes, draps, taies...) et le laver en machine à 60° C ou le désinfecter avec un acaricide (stockage en sac plastique avec produit acaricide pendant au moins trois heures) ou par mise en quarantaine de quatre jours (gale commune) à huit jours (gale profuse) dans un sac plastique.

- Après le traitement de l'environnement, prendre sa douche avec un savon liquide, se rincer abondamment et se sécher avec une serviette propre. Utiliser un pyjama et du linge de lit propres.

Remarque : le délai d'action de l'ivermectine étant d'au moins huit heures, un traitement de l'environnement le lendemain matin, à J1, ne présente pas de risque de réinfestation, la personne étant protégée par son traitement. Ce traitement de l'environnement pourrait être effectué à J0 en fin d'après-midi mais en cas de désinfection de la literie par un acaricide, celle-ci ne pourra être utilisée pendant 12 heures.

### **J + 15 (+/-) : 2eme prise du traitement médical**

Sur prescription médicale, prise d'une deuxième cure d'ivermectine 15 jours après la première.

Après traitement, le prurit régresse le plus souvent en deux à trois jours. Cependant, les démangeaisons peuvent persister quelques semaines sans pour autant être un signe d'échec du traitement.