



La santé au travail dans les hôpitaux, cliniques MCO, SSR, ULSD, EHPAD et établissements médico-sociaux

**Informations et Documentations**

<https://hopital-sante-travail.fr/>

---

## Lettre d'information (23/12/2022)

Pour chaque item, plus d'infos en cliquant sur les liens soulignés

---

### 1. Vaccinations

**COVID-19 : [Pour l'Académie de médecine, réintégrer les soignants non vaccinés contre la Covid-19 reste une mauvaise option](#)** (13/12/2022)

**COVID-19 [Place des vaccins de Novavax et Sanofi dans la stratégie vaccinale](#)**

#### 1. Vaccin Nuvaxovid® du laboratoire Novavax

Conformément à l'avis de la HAS du 1er décembre 2021, le vaccin Nuvaxovid® du laboratoire Novavax est désormais autorisé en rappel vaccinal chez les adultes de 18 ans et plus, primo-vaccinés avec le vaccin Novavax, ou primo-vaccinés avec un vaccin à ARN messenger (Comirnaty® de Pfizer-BioNTech ou Spikevax® de Moderna) ou un vaccin à vecteur adénoviral (JCovden® de Janssen ou Vaxzevria® de AstraZeneca).

L'utilisation du vaccin Nuvaxovid® en rappel est une alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent plus recevoir un vaccin à ARN messenger. Les rappels vaccinaux doivent toutefois être réalisés préférentiellement avec des vaccins à ARNm bivalents.

Le vaccin Nuvaxovid® est toujours indiqué en primo-vaccination chez les adultes âgés de 18 ans et plus qui le souhaitent ou qui ont une contre-indication aux autres vaccins disponibles. Le schéma de primo-vaccination comporte deux doses à 21 jours d'intervalle, avec une tolérance de 18 à 28 jours pour effectuer la deuxième injection. Concernant la possibilité d'une deuxième dose dite « hétérologue », c'est-à-dire une deuxième dose de vaccin Nuvaxovid® pour les personnes ayant reçu

une première dose d'un autre vaccin contre le Covid-19 (des laboratoires Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ou Janssen) et qui refusent ou ne peuvent pas recevoir une seconde dose du même vaccin, le vaccin Nuvaxovid® doit être injecté entre 25 et 35 jours après la première dose.

Dans l'attente de données complémentaires, l'utilisation du vaccin Nuvaxovid® n'est pas recommandée chez la femme enceinte, que ce soit pour des primo-vaccinations ou pour des rappels.

## **2. Vaccin VidPrevtyl® Beta des laboratoires Sanofi Pasteur et GSK**

Conformément à l'avis de la HAS du 1er décembre 2022, le vaccin VidPrevtyl® Beta des laboratoires Sanofi Pasteur et GSK est autorisé en rappel, chez les adultes de 18 ans et plus, primo-vaccinés avec un vaccin à ARN messenger (Comirnaty® de Pfizer-BioNTech ou Spikevax® de Moderna) ou avec un vaccin à vecteur adénoviral (Jcovden® de Janssen ou Vaxzevria® de AstraZeneca).

A ce stade, le vaccin de Sanofi ne peut être utilisé qu'à une seule reprise, en rappel, quel que soit son rang (premier rappel ou rappel additionnel), conformément à son autorisation de mise sur le marché.

L'utilisation du vaccin VidPrevtyl® Beta en rappel est une alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent plus recevoir un vaccin à ARN messenger.

Conformément aux recommandations de la HAS, les vaccins à ARN messenger bivalents restent à utiliser de manière préférentielle aux autres vaccins. L'obtention d'éléments complémentaires est en effet nécessaire afin de démontrer une efficacité similaire du vaccin de Sanofi Pasteur vis-à-vis des sous-variant d'Omicron actuellement en circulation, par rapport aux vaccins à ARN messenger bivalents.

Par ailleurs, dans l'attente de données complémentaires, l'utilisation du vaccin VidPrevtyl® Beta n'est pas recommandée chez la femme enceinte.

Les vaccins à ARN messenger bivalents doivent être utilisés chez les femmes enceintes.

### **Vaccin PFIZER Bivalent : [Place des vaccins Comirnaty bivalents Original/Omicron BA.1 et Original/Omicron BA.4-5.](#)**

[COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 \(15/15 µg\) BIONTECH-PFIZER](#) (site mesvaccins.net)

**NB : utilisable uniquement pour les rappels** (Primo-vaccination uniquement avec le vaccin monovalent)

[Préparation & modalités d'injection](#)

### **Vaccin MODERNA Bivalent :**

[Place du vaccin Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 \(ARNm-1273.214\)](#)

- [SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.1 \(50 µg/50 µg\)/mL MODERNA](#) : [site MesVaccins.net](https://mesvaccins.net)

NB : utilisable uniquement pour les rappels (Primo-vaccination uniquement avec le vaccin monovalent)

[Préparation & modalités d'injection](#)

- [SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 \(50 µg/50 µg\)/mL MODERNA](#) : [site MesVaccins.net](https://mesvaccins.net)

NB : utilisable uniquement pour les rappels (Primo-vaccination uniquement avec le vaccin monovalent)

## **2. Vaccin Sanofi "Vidprevtyn Beta"**

Le laboratoire Sanofi a obtenu le 11 novembre 2022 une autorisation de mise sur le marché pour son vaccin contre le Covid-19. Un avis de la HAS est attendu prochainement afin de préciser la place de ce vaccin dans la stratégie vaccinale française mais il ne sera utilisable qu'en rappel.

Il s'agit d'un vaccin utilisant comme antigène une protéine recombinante copie de la protéine de surface d'un variant Beta du SARS-CoV-2 et un adjuvant, appelé AS03, qui permet de renforcer et d'orienter favorablement la réponse immunitaire.

- [Article de MesVaccins.net](#)
- [Fiche Descriptive \(MesVaccins.net\)](#)

[Préparation et modalités d'injection du vaccin Vidprevtyn](#)

---

## **2. Risques psychosociaux**

- **Violences à l'hôpital** - [Rapport 2022 \(données 2020-2021\) de l'Observatoire National des Violences en Milieu de Santé \(ONVS\)](#)
- [Dépression chez les soignants en France : résultats de l'enquête AMADEUS](#) (APHM)
- **COVID-19** : [La santé mentale des soignants en période de pandémie Covid-19](#) (article de [Santé Publique France](#) - 23/11/2022)

- **[VIOLENCES EXTERNES EN SERVICES D'URGENCES HOSPITALIÈRES : ÉCLAIRAGE THÉORIQUE ET PRATIQUE POUR LA PRÉVENTION](#)** (article paru dans la revue "*Hygiène & Sécurité au travail*")
- **COVID-19 : [La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques \(DREES\)](#)** publie une étude consacrée aux conditions de travail du personnel hospitalier durant la crise sanitaire. Cette étude est réalisée à partir des données issues du troisième volet de l'enquête Épidémiologie et conditions de vie (EpiCov) élaborée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et la DREES [Publication \(juillet 2022\)](#)

#### **Aide aux professionnels de santé en souffrance – Focus sur 2 dispositifs :**

- **[Dispositif "ETAPE "](#)** : Aide aux soignants présentant une atteinte de leur santé psychique en lien avec leur travail ([Île de France](#))
- **[Association "Mots"](#)** (intervention dans plusieurs villes en France : Toulouse, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Limoges, Orléans, Lille, Paris, Amiens, Caen)

#### **Une mine de connaissances et d'expériences : les Mémoires des étudiants du DIU « Soigner les soignants »**

##### **[Accès aux Mémoires](#)**

---

#### **Et toujours :**

Actualités bibliographiques : consultez notre [page web dédiée](#) pour ne rien rater des publications sur la santé au travail des soignants

---

**Et n'oubliez pas :** [hopital-sante-travail.fr](http://hopital-sante-travail.fr) se veut participatif ! N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire des suggestions, proposer des documents ou nous informer des nouveautés (actualité, réglementation etc...). Le site est régulièrement mis à jour.

(Dés)Inscrivez-vous à la lettre d'information périodique d'[Hôpital-Santé-Travail](#) :

[contact@hopital-sante-travail.fr](mailto:contact@hopital-sante-travail.fr)

avec vos nom, prénom, profession, lieu d'exercice et adresse mail

cf. [Politique de confidentialité](#)