

2. Modalités de l'antibioprophylaxie des sujets contacts de cas index (HCSP, 30 juillet 2024)

Molécule	Galénique	Posologie	Durée
Azithromycine	<ul style="list-style-type: none"> Comprimés à 250 mg Solution buvable 40 mg/ml (« dose poids ») 	<ul style="list-style-type: none"> Nouveau-nés : 10 mg/kg x 1/jour Enfants de 1 mois à 17 ans : <ul style="list-style-type: none"> dose poids x 1/jour (soit 20 mg/kg/jour), sans dépasser la posologie adulte de 500 mg 1 fois par jour Adultes : 500 mg x 1/jour 	3 jours
Clarithromycine	<ul style="list-style-type: none"> Comprimés à 250 et 500 mg Solution buvable 25 mg/ml et 50 mg/ml (« dose poids ») Poudre pour injectable 500 mg/flacon 	Nouveau-nés : 7,5 mg/kg x 2/jour <ul style="list-style-type: none"> Enfants de 1 mois à 17 ans : <ul style="list-style-type: none"> jusqu'à 30 kg : dose poids x 2/jour 30-40 kg : 250 mg x 2/jour >40 kg : 500 mg x 2/jour Adultes : 500 mg x 2/jour 	7 jours
Erythromycine	<ul style="list-style-type: none"> Comprimés à 500 mg, Poudre pour injectable 500 mg et 1 g 	<ul style="list-style-type: none"> Nouveau-nés : 10-15 mg/kg x 4 / jour (injectable) Enfants de 1 mois à 17 ans : <ul style="list-style-type: none"> quel que soit âge et poids : 10-15 mg/kg x 4 / jour (injectable) 25-35 kg (et > 8 ans) : 500 mg x 2 / jour PO 35-40 kg : 500 mg x 3 / jour PO >40 kg : 1 g x 2 / jour PO Adultes : 1 g x 2 / jour 	7 jours
Cotrimoxazole (triméthoprime-sulfaméthoxazole)	<ul style="list-style-type: none"> Comprimés à 80-400 mg et 160-800 mg (« forte ») Suspension buvable 8-40 mg/ml Solution pour injectable 80-400 mg 	<ul style="list-style-type: none"> Nouveau-nés : non indiqué avant 6 semaines de vie Enfants 6 semaines à 17 ans : <ul style="list-style-type: none"> 6 semaines - 5 mois : 20-100 mg (2,5 ml) x 2 / jour 6 mois - 5 ans : 40-200 mg (5 ml) x 2 / jour 6-11 ans : 80-400 mg (10 ml ou 1 cp) x 2 / jour 12-17 ans : 160-800 mg (20 ml ou 1 cp forte) x 2 / jour Adultes (sauf femmes enceintes) : 160-800 mg (20 ml ou 1 cp forte) x 2 / j 	7 jours